Guía de Siembra para Marzo

(Septiembre - Hemisferio Sur)

mercagarden.com
HUERTOS URBANOS
info@mercagarden.com - 605 04 55 62

Acelgas

- Tipo de cultivo biodinámico: Hoja.
- Siembra: directa a voleo, sin transplante.
- Tiempo de germinación: 9-12 días.Tª óptima 20ºC.
- Volúmen de sustrato: 22-25 litros.
- Riego: ligero y frecuente. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección escalonado: 2 a 4 meses.

Calçots

- Tipo de cultivo biodinámico: Bulbo (raíz).
- Siembra: directa o en semillero.
- Tiempo de germinación: 10-12 días.Tª óptima 20ºC.
- Transplante cuando tengan el grosor de un lápiz.
- Volúmen de sustrato: 5 litros. Profundidad mín.: 20 cm.
- Riego: escaso y espaciado.
- Tiempo de recolección: 4 a 5 meses,

Lechuga

- Tipo de cultivo biodinámico: Hoja.
- Siembra: en semillero o macetitas de turba.
- Tiempo de germinación: 6-8 días.Tª óptima 15ºC.
- Transplante cuando tengan 4-5 hojas.
- Volúmen de sustrato: 3 litros. Cultivo sencillo.
- Riego: ligero y frecuente. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección escalonada: 2 a 4 meses.

Rabanitos

- Tipo de cultivo biodinámico: Raíz.
- Siembra: directa, sin trasnplante.
- Tiempo de germinación: 5-7 días.Tª óptima 15ºC.
- Volúmen de sustrato: 2 litros. Cultivo sencillo.
- Profundidad mín.: 15 cm.
- Riego: ligero cada día. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección escalonada: 4 a 5 semanas.

Apio

- Tipo de cultivo biodinámico: Hoja y tallo.
- Siembra: en semillero o macetitas de turba.
- Tiempo de germinación: 15-18 días.Tª óptima 20ºC.
- Transplante cuando tengan 3-4 hojas.
- Volúmen de sustrato: 9-10 litros.
- Riego: frecuente y abundante. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección: 7 a 8 meses.

Cebollas

- Tipo de cultivo biodinámico: Bulbo (raíz).
- Siembra: semillero o macetita de turba protegida.
- Tiempo de germinación: 10- 12 días.Tª óptima 20ºC.
- Transplante cuando tengan el grosor de un lápiz.
- Volúmen de sustrato: 5 litros. Profundidad mín.: 20 cm.
- Riego: escaso y espaciado.
- Tiempo de recolección: 2 a 3 meses tiernas, 5 a 6 meses secas,

Melón

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 10 - 12 días.Tª óptima 20-25ºC.
- Transplante cuando tenga 3-4 hojas.
- Volúmen de sustrato: 28-30 litros.
- Riego: frecuente al principio, ligero si forma mata.
- Tiempo de recolección: 3 a 4 meses.



Remolachas

- Tipo de cultivo biodinámico: Raíz.
- Siembra: directa, a voleo o en línea. Sin transplante. Protegida en zonas frías.
- Tiempo de germinación: 8-12 días.Tª óptima 15-18ºC.
- Volúmen de sustrato: 5 litros.
- Profundidad mín.: 15 cm.
- Riego: ligero cada día. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección escalonada: 3 a 4 meses.

Berenjenas

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 7-10 días.Tª óptima 20-25ºC.
- -Transplante cuando tengan 12cm, a tresbolillo.
- Volúmen de sustrato: 15-20 litros.
- Entutorar cuando alcancen los 20 cm.
- Riego: ligero y frecuente. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección: 6 a 7 meses.

Espinaca

- Tipo de cultivo biodinámico: Hoja.
- Siembra: directa, sin transplante.
- Tiempo de germinación: 7- 12 días.Tª óptima 15-20ºC.
- Volúmen de sustrato mín.: 3 litros. Cultivo sencillo.
- Riego: ligero y frecuente. No encharcar.
- Tiempo de recolección escalonado: 2 a 3 meses.

Pepino

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: directa o en semillero de turba protegidos.
- Tiempo de germinación: 8-10 días.Tª óptima 20-30ºC.
- Muy sensible al frío. Transplante difícil.
- Volúmen de sustrato mín.: 15 litros.
- Riego: frecuente desde el inicio del cultivo.
- Tiempo de recolección: 3 a 4 meses.

Sandia

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 10 - 12 días.Tª óptima 20-25ºC.
- Transplante cuando tenga 3 - 4 hojas.
- Volúmen de sustrato: 30-35 litros.
- Riego: frecuente. Mantener húmedad.
- Tiempo de recolección: 4 a 5 meses.

Calabacin

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 8-10 días.Tª óptima 20-25ºC.
- Aclarado cuando tengan 15cm de altura.
- Volúmen de sustrato: 20-22 litros.
- Riego: generoso y abonado.
- Tiempo de recolección:3 a 4 meses.

Fresas

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero protegido o invernadero.
- Tiempo de germinación: 15-20 días.Tª óptima 18-22ºC.
- Transplante cuando tengan 4-5 hojas verdaderas.
- Volúmen de sustrato: 5-7 litros.
- Riego: intenso en siembra. Mantener la humedad.
- Tiempo de recolección escalonada: a partir de 10 meses,

Pimientos

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 5-10 días.Tª óptima 20-25ºC.
- Transplante cuando tengan 12-15cm.
- Volúmen de sustrato: 15-20 litros.
- Entutorar cuando alcancen los 20-30 cm.
- Riego: ligero y frecuente. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección: 5 a 7 meses.



Tomates

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 5-10 días.Tª óptima 20-25ºC.
- Transplante cuando tengan 3- 4 hojas verdaderas.
- Volúmen de sustrato: 15-20 litros.
- Entutorar cuando alcancen los 20-30 cm.
- Riego: espaciado y cuantioso.
- Tiempo de recolección: 4 a 5 meses, ciclo corto; 6 a 7 meses; ciclo largo.

Calabaza

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: en semillero calefactado o invernadero.
- Tiempo de germinación: 12-18 días.Tª óptima 20-30ºC.
- Transplante cuando tengan 2-3 hojas verdaderas.
- Volúmen de sustrato: 30-35 litros.
- Gran desarrollo en superficie, marco de plantación 1m.
- Riego: frecuente. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección:3 a 4 meses.

Judias

- Tipo de cultivo biodinámico: Fruto.
- Siembra: directa de asieto de 2- 3 semillas.
- Tiempo de germinación: 8-10 días.Tª óptima 20ºC.
- Volúmen de sustrato: 14-20 litros.
- Entutorar a los 20-30cm.
- Riego: 2-3 veces/semana. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección: 2 a 3 meses.

Puerros

- Tipo de cultivo biodinámico: Bulbo (raíz).
- Siembra: directa, en semillero o macetitas de turba.
- Tiempo de germinación: 10-15 días.T ª óptima 15-18ºC.
- Transplante: cuando tengan 20 cm de altura.
- Volúmen de sustrato: 4-5 litros.
- Profundidad mín.: 25-30 cm.
- Riego: ligero. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección: 4 a 5 meses.

Zanahorias

- Tipo de cultivo biodinámico: Raíz.
- Siembra: directa a voleo, sin transplante.
- Tiempo de germinación: 12-15 días.Tª óptima 18ºC.
- Volúmen de sustrato: 3 litros.
- Profundidad mín.: 20 cm.
- Riego: ligero cada día. Mantener humedad.
- Tiempo de recolección escalonado: 3 a 4 meses.